

タイケルブ[®]錠250mg 服用のポイント

監修：国立病院機構大阪医療センター 外科・乳腺外科 増田 慎三 先生

タイケルブ[®]（ラパチニブ）について

- タイケルブはHER2陽性乳癌治療のお薬です。
- カペシタビン（ゼローダ[®]）というお薬もあわせて服用します。

服用前のチェックリスト

次の方はタイケルブを飲むことができません。

- タイケルブを飲んでアレルギー症状が出たことがある方
- 妊娠している方または妊娠している可能性のある方
- 妊娠を希望される方

次の方はタイケルブ服用の際に注意が必要です。

- 肝機能障害のある方
- 間質性肺疾患またはその既往歴のある方
- 心不全症状またはその既往歴のある方
- 心機能に問題のある方
- 授乳中の方

大切な注意事項

お薬の服用について

▼ 他のお薬を服用するとき

➡ **必ず事前に医師・薬剤師にご相談ください。**

タイケルブには一緒に服用しないほうがよいお薬がいくつかあります。

▼ 以前に処方されたタイケルブが残っているとき

➡ **ご自分で勝手に飲み始めないようにしてください。**

他の診療科、病院を受診するとき

- 事前に主治医にご相談ください。
- タイケルブを服用中であることを必ず伝えてください。

お薬の飲み方


1日の服用スケジュール

タイケルブ

1日1回5錠、食事の前後1時間以内を避けて服用してください。
ご自分で都合のよい服用時間を決めて、毎日その時間に飲むように
しましょう。



タイケルブ錠
(実物大)



カペシタビン (ゼローダ®)

決められた量を1日2回、朝夕の食後30分以内に服用してください。

お薬の飲み方

継続的服用スケジュール



お薬の飲み方の例

◎タイケルブ ★カペシタビン



服用上の注意点

タイケルブの1日の服用量は、1回で飲んでください。

➡ 分割して飲まないようにしてください。

朝と夜に2錠と3錠に分けて飲むなどはしないでください。

タイケルブは錠剤のまま飲んでください。

➡ 錠剤を砕く、割る、水やぬるま湯に溶かすなどはしないでください。

お薬を飲み忘れてしまったときは

➡ そのままとばして次の回から飲んでください。
決して2回分を一度に飲まないでください。

間違えて一度にたくさん飲んでしまったときは

➡ すぐに医師・薬剤師に相談してください。

グレープフルーツ、グレープフルーツジュース、
セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)*は控えてください。

➡ タイケルブの効果に影響を及ぼすおそれがあります。

※:セイヨウオトギリソウはハーブの一種で、抗うつ作用のあるサプリメントとして薬局などで売られています。

次のような症状に気をつけてください

次のような症状があらわれたら、お薬の服用を中止して、すぐに主治医に連絡してください

① 息切れ、呼吸困難、咳、発熱、むくみなど

➡ 間質性肺疾患、または心機能低下の可能性があります

② 水のような下痢が続く、くり返す

➡ 脱水症状をきたす恐れがあります

③ 手足の皮膚の赤い腫れ、ひどい痛み

➡ 手足症候群の可能性があります

次のような症状があらわれたら、早めに主治医に連絡してください

- 1日の排便回数が通常時より4回以上増えた
- 吐き気、嘔吐がおさまらない
- 食欲がなく、全身がだるい
- ひどい口内炎で食事が困難、水分も摂りにくい
- 全身の疲労感があり、日常の生活でもつらい
- 全身に発疹ができた
- 発疹がかゆくてがまんできない
- 手や足(かかとなど)の赤み、腫れ、ひび割れ、痛み
- 爪の周囲の腫れ、痛み、熱感など

これ以外でも何か気になる症状があらわれたときは、主治医や薬剤師に相談してください。

副作用と注意点

このような副作用があらわれることがあります

下痢

吐き気、嘔吐、食欲不振

口内炎

全身の疲労感

発疹

手足の皮膚炎、皮膚の乾燥、爪・爪周囲の変化

下痢になったら

- 主治医から処方されている下痢止めのお薬を服用してください。
- 下痢止めを飲んでも症状がおさまらなかったら、主治医に連絡してください。



日常生活の注意点

- アルコールの入っていない保湿クリームを塗って皮膚の乾燥を防ぐようにしましょう。
(例；ワセリンなど)
- SPF30以上の、紫外線予防効果の高い日焼け止めを顔や手足などに使い、紫外線による刺激を避けるようにしましょう。



その他の注意点は「タイケルブ®(ラパチニブ)を服用される方へ」を参考にしてください。

Tykerb[®]

製造販売元 [資料請求・問い合わせ先]

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-6-15
TEL : 0120-561-007 (9:00~18:00 / 土日祝日および当社休業日を除く)
FAX : 0120-561-047 (24時間受付)
<http://www.glaxosmithkline.co.jp>

提携 [資料請求・問い合わせ先]

日本化薬株式会社

〒102-8172 東京都千代田区富士見一丁目11番2号
TEL : 0120-505-282 (9:00~17:30 / 土日祝日および当社休業日を除く)
<http://mink.nipponkayaku.co.jp/>

TKXT0019-D0905N
TK-19-GSK-200905-1-1-00
作成年月2009年5月